

การศึกษาความชุกของพยาธิชนิดติดต่อผ่านทางดินจากตัวอย่างดินในหมู่บ้านกะเรี่ยงชนบท นาอ่องใต้

วีระชิต แหวนหล่อ*

วีโรจน์ ไวยานิชกิจ* อัครเดช สุยะพันธ์**

วีระชิต แหวนหล่อ, วีโรจน์ ไวยานิชกิจ, อัครเดช สุยะพันธ์. การศึกษาความชุกของพยาธิชนิดติดต่อผ่านทางดินจากตัวอย่างดินในหมู่บ้านกะเรี่ยงชนบท นาอ่องใต้. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2545 พ.ย; 46(11): 941 - 7

เบื้องหลัง

: โรคติดเชื้อหนอนพยาธิยังคงนับเป็นปัญหาที่สำคัญของคนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทย รวมถึงชุมชนชาวไทยภูเขาในประเทศไทย ด้วยซึ่งมีความชุกของการติดเชื้อหนอนพยาธิน้ำมากพอสมควร จึงได้ทำการศึกษาทางระบบดิบวิทยา ซึ่งนอกจากจะใช้วิธีการตรวจหาตัวพยาธิในอุจจาระแล้ว การสำรวจการปนเปื้อนของหนอนพยาธิในดินก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถจะกระทำได้เพื่อศึกษาถึงโอกาสในการแพร่เชื้อพยาธิเหล่านี้ในระบบนิเวศน์จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นต่อไปได้

สถานที่ทำการศึกษา : ชุมชนชาวเขาเผ่ากะเรี่ยง ณ หมู่บ้านนาอ่องใต้ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดิน 24 ตัวอย่างจากบริเวณต่างๆ ในบริเวณรอบๆ ตัวบ้านทั้งหมด 24 ครัวเรือน

วิธีการ

: การศึกษาใช้วิธีการที่เรียกว่า *Floatation technique* โดยทำการศึกษาในตัวอย่างดินที่ได้เก็บรวบรวมมา

ผลการศึกษา

: จากการศึกษาตัวอย่างดินทั้งหมดที่เก็บมา พบว่าร้อยละโดยรวมของการปนเปื้อนของพยาธิทั้งหมดที่พบในดิน คิดเป็นร้อยละ 16.67 โดยชนิดของพยาธิที่พบมากที่สุดคือ *Ascaris lumbricoides* และเมื่อเปรียบเทียบค่านี้ กับการศึกษาที่ผ่านมาในภาคใต้ของไทย พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

* ภาควิชาเวชศาสตร์รัตนสุตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สรุป	:	อัตราการปนเปื้อนของพยาธิในดินในชุมชนแห่งนี้ค่อนข้างสูง ดังนั้นการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมุ่ลฐานแก่ชุมชนแห่งนี้ยังมีความจำเป็นอยู่
คำสำคัญ	:	พยาธิในดิน, การปนเปื้อนของดิน

Reprint request : Waenlor W, Department of Laboratory Medicine, Faculty of Medicine,

Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand.

Received for publication. June 15, 2002.

Waenlor W, Wiwanitkit V, Suyaphan A. Study of soil contamination with geohelminths in a rural Karen village, Nahongtai. Chula Med J 2002 Nov; 46(11): 941 - 7

- Introduction** : *Intestinal parasite infection is still an important health problem in Thailand including to the hilltribe communities. Apart from stool examination, another epidemiological study is soil contamination study. The soil contamination study can be a useful indicator for monitoring occasion of transmission of parasite from one host to the other.*
- Setting** : *Nahongtai Village, Mae Jam District, Chiangmai Province. In this study we collected 24 soil samples from all available 24 houses in this village.*
- Method** : *We used the floatation technique in examination of soil parasitic contamination.*
- Result** : *The rate of soil parasitic contamination in our study was equal to 16.67 %. The most common contaminated helminth was Ascaris lumbricoides. This percentage is different from the previous study in the Southern Region.*
- Conclusion** : *The rate of soil parasitic contamination in this study is high hence the primary health sanitation for this community is necessary.*
- Keywords** : *Geohelminth, Soil contamination.*

โรคหนอนพยาธิ (Helminthic diseases) เป็นโรคที่สามารถพบได้ทั่วโลก โดยแต่ละพื้นที่จะมีความซุกและอุบัติการณ์แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกต่างทางภูมิประเทศและภูมิอากาศนั่นเอง⁽¹⁾ ตัวอย่าง เช่นหนอนพยาธิตัวกลมในลำไส้ (Intestinal nematodes) พับมากในบริเวณเขตร้อนชื้นและอบอุ่น⁽²⁾ โดยการติดโรคนั้นเกิดจากการรับเข้าระยะติดต่อ (infective stage) ของตัวพยาธิเข้าไป ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายทาง เช่น การปนเปื้อนในอาหารหรือน้ำดื่ม การซ่อนไข่ผ่านเข้าไปทางผิวนังของผู้ถูกอาศัย (host) เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญก่อนที่พยาธิเหล่านี้จะติดต่อไป host อีน ๆ ได้ จะต้องมีการขับถ่ายพยาธิลงสู่พื้นดิน เพื่อให้วงจรชีวิตของมันดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ จึงเรียกพยาธิพิพากนี้ว่า "soil - transmitted helminthes" ซึ่งโรคหนอนพยาธิเหล่านี้นับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย⁽³⁾

Soil - transmitted helminthes ที่สำคัญมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด⁽⁴⁾ เช่น Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, hookworms, Strongyloides stercoralis เป็นต้น โดยปัจจัยที่มีผลอย่างยิ่งต่อการปนเปื้อนของพยาธิเหล่านี้ในพื้นดิน ก็คือ การขับถ่ายของ host ลงสู่พื้นดินโดยตรง อันเนื่องมาจากการบุกเบิกและการตัดต่อต้นไม้ โดยเฉพาะตามชานบที่พื้นที่ห่างไกล ประกอบกับความชื้นและภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้หนอนพยาธิเหล่านี้เจริญเติบโตจนเป็นระยะติดต่อและมีผลต่อการอยู่อาศัยของมนต์ด้วย^(2,5,6)

ดังนั้นการศึกษาทางระบบดิบวิทยา นอกจากจะสามารถทำได้โดยวิธีการตรวจดูจากกระเพาะ ซึ่งทำกันอยู่โดยทั่วไปแล้ว ยังสามารถทำได้อีกวิธีหนึ่ง นั่นคือ การสำรวจการปนเปื้อนของพยาธิในดิน เนื่องจากการปนเปื้อนของพยาธิที่มีวงชีวิตสมดลักษณะนี้ ย่อมมีโอกาสที่จะสามารถแพร่เชื้อไปสู่ host อีน ๆ ต่อไปได้ โดยการศึกษาด้วยวิธีการนี้มีอยู่หลายชั้น ในหลายพื้นที่ในต่างประเทศรวมทั้งในประเทศไทยด้วย เช่นการศึกษาของ Alonso JM,et al.⁽⁷⁾ ในประเทศไทยอาจเจนตนา การศึกษาของ Mukaratirwa S,

et al⁽⁶⁾ ใน Zimbabwe รวมทั้งการศึกษาของ Ugas., et al. ซึ่งทำการสำรวจดินทรายอย่างในภาคใต้ของประเทศไทย ทั้งหมด 2 ชิ้นงาน^(2,8) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น โดย Shimizu T.⁽⁹⁾ และการศึกษาของ Schulz S, et al.⁽¹⁰⁾ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบว่า มีการติดต่ออย่างไรก็ตาม รายงานการศึกษาที่ปรากฏออกมานั้น ได้ถูกตีพิมพ์ออกมาในระยะเวลาพอสมควรแล้ว และได้ให้ความสนใจเฉพาะในบางกลุ่มประชากรเท่านั้น ประกอบกับปัญหาโรคหนอนพยาธินี้ ยังเป็นปัญหาที่สำคัญในประเทศไทยในทุกกลุ่มคน โดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ดังนั้นการศึกษานี้จึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะรายงานการศึกษา การสำรวจการปนเปื้อนของหนอนพยาธิในดินจากหมู่บ้านชาวเขาผู้เชื้อสายหิวาย เนื่องจากพบว่ามีความซุกของการติดเชื้อหนอนพยาธิในคนสูง⁽¹¹⁾ และจากการศึกษาที่พบว่ามีความซุกของการปนเปื้อนของหนอนพยาธิในดินค่อนข้างสูงด้วย อนึ่งรายงานการศึกษานี้ถือเป็นรายงานแรกของโลกที่ได้มีการศึกษาในชุมชนชาวเชื้อสายหิวาย

วัสดุและวิธีการ

1. Sample collection

Study setting

การศึกษาในครั้งนี้มีกลุ่มประชากรเป็นชาวเชื้อสายหิวาย โดยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจากหมู่บ้านชาวเชื้อสายหิวาย แห่งหนึ่ง ซึ่ง หมู่บ้านนี้อยู่ในตัว อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ซึ่งมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 800 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวเชื้อสายหิวาย มีประชากรประมาณ 200 คน สำหรับภูมิอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้น โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝน คือช่วงเดือนพฤษภาคม เราได้เก็บตัวอย่างดินมาจากหมู่บ้านแห่งนี้ โดยการสูบม้าจากแหล่งต่าง ๆ ในบริเวณบ้านเรือน ในหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 24 ครัวเรือน ตัวอย่างทั้งหมด 24 ตัวอย่าง ได้ถูกเก็บใส่กล่องพลาสติกใส ฝาปิดสนิทและทำการติดฉลากไว้ จากนั้นได้ทำการส่งมาตราชทางห้องปฏิบัติการต่อไป

การศึกษาทั้งหมดได้กระทำโดยมีการขออนุญาต กับคนในหมู่บ้านก่อน ที่เรียกว่าการบอกรักษาเจ้า

(verbal informed consent) และได้รับความร่วมมือจากคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดียิ่ง

2. Analysis of soil

การศึกษาการปนเปื้อนของหนอนพยาธิในดินครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการที่เรียกว่า floatation technique⁽¹²⁾ ด้วยสารเคมีคือ normal saline – glucose solution นำดินตัวอย่างที่ได้จากหมู่บ้านเหล่านี้มาใส่ลงไปในสารละลายนี้แล้วปล่อยให้ตกลงกองเอง โดยไม่มีการวนรวมใด ๆ เป็นเวลานาน 30 นาที จากนั้นrinสารละลายส่วนบนทิ้ง แล้วนำดินที่เหลือมาทำการวิเคราะห์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 40 เท่าต่อไป

3. Statistical analysis

การศึกษานี้เป็นการศึกษาในระดับ cross-sectional โดยเราได้แสดงผลความชุกของพยาธิโดยรวมที่พบปนเปื้อนในดินของกามาในรูปของจำนวนร้อยละ และ

ได้ทำการเปรียบเทียบกับความชุกของพยาธิโดยรวมที่พบปนเปื้อนในดินจากผลรายงานศึกษาขั้นอื่น ๆ ที่ปรากฏออกมากด้วย ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่โดยใช้วิธีทดสอบทางสถิติแบบ proportional Z-test ที่ $p = 0.05$ ในกรณีเคราะห์เปรียบเทียบผล

ผลการศึกษา

จากการศึกษาตัวอย่างดินทั้งหมดจากหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในครั้งนี้ พบว่ามีจำนวนร้อยละโดยรวมของพยาธิทั้งหมดในดินตัวอย่าง คิดเป็น 16.67 เปอร์เซ็นต์ อัตราโดยรวมนี้เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลจากการศึกษาขั้นอื่น ๆ ที่ผ่านมา ปรากฏออกมากดังตารางที่ 1

โดยจากการเปรียบเทียบอัตราส่วนโดยรวมของการปนเปื้อนของหนอนพยาธิที่พบในดินตัวอย่างทั้งหมดจากหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง กับอัตราส่วนโดยรวม จาก

ตารางที่ 1. แสดงอัตราโดยรวมของพยาธิทั้งหมดในดินเปรียบเทียบกับผลจากการศึกษาขั้นอื่น ๆ

No.	การศึกษาของ	สถานที่	ปีที่ ตีพิมพ์	จำนวนตัวอย่าง ดินที่มีการปนเปื้อน	หนอนพยาธิที่ พบมากที่สุด(%) (% โดยรวม)
1.	Alonso JM., et al(*)	Subtropical city, Argentina	ม.ย.2001	1.3 (**)	<i>Toxocara spp.</i> (1.3) <i>T.canis</i> (3.7)
2.	Mukaratiwa S., et al (*)	Suburban park & play ground in Harare, Zimbabwe	ก.ย.1999	3.7 (**)	<i>Toxocara eggs</i> (63.3)
3.	Shimizu T. (*)	Tokushima city, Japan	ต.ค. 1993	63.3 (**)	<i>A.lumbricoides</i> (47.69)
4.	Uga S., et al	Phatthalung & Songkhla, Southern Thailand	1997	64.67	<i>A.lumbricoides</i> (66.67)
5.	Waenlor W., et al	Hilltribe community, northern Thailand	ต.ค. 2001	16.67	

(*) ผู้ทำการวิจัยได้ศึกษาและรายงานผลหนอนพยาธิเพียงชนิดเดียวในดินตัวอย่างเท่านั้น

(**) จำนวนร้อยละของหนอนพยาธิชนิดนั้นที่ค้นพบในดินตัวอย่างที่ศึกษา

ผลการศึกษาของ Uga S., et al. ซึ่งได้ทำการศึกษาใน 2 ชุมชนของ 2 จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย คือจังหวัดพัทลุง และสงขลา นั้น โดยใช้การทดสอบทางสถิตแบบ비-proportional Z-test ที่ $p = 0.05$ เพื่อหาว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ ก็พบว่าการปนเปื้อนของหนอนพยาธิในดินตัวอย่างจากการศึกษาของทั้ง 2 ชั้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ($p < 0.05$)

วิจารณ์

การปนเปื้อนของพยาธิในดินนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก การที่มีการปนเปื้อนของหนอนพยาธิเหล่านี้ในดิน ย่อมเพิ่มโอกาสของการแพร่เชื้อของหนอนพยาธิจาก host หนึ่งไปอีก host หนึ่งได้ โดยมีการศึกษานลายชั้นได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การปนเปื้อนของหนอนพยาธิในดินกับความชุกของการติดเชื้อหนอนพยาธิในคน ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ van Niekerk CH, et al.⁽¹³⁾ ได้ศึกษาการแสดงอาการจากการติดเชื้อหนอนพยาธิในลำไส้ในเด็กกับการปนเปื้อนของหนอนพยาธิเหล่านี้ในดิน โดยเปรียบเทียบกันระหว่างเด็กในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ก็พบว่าความชุกของการแสดงอาการทางคลินิกจากการติดเชื้อหนอนพยาธิในลำไส้ของเด็กในชุมชนเมือง จะสูงกว่าเมื่อเทียบกับเด็กในชุมชนชนบท ซึ่งการศึกษาชั้นนี้ระบุว่าเกิดขึ้นเนื่องมาจาก การปนเปื้อนของไข่ของหนอนพยาธิในดินที่สูงกว่าชั้นสอง หรือแม้กระถั่งการศึกษาของ Alonso JM, et al.⁽⁷⁾ ได้ชี้แจงว่า การติดเชื้อของหนอนพยาธิชนิด *Toxocara* ในคนมักจะเกิดขึ้นจากการได้รับเชื้อเหล่านี้ภายใต้สถานะเขตรอบบ้านมากกว่าบริเวณอื่น เช่น สวนสาธารณะหรือสถานที่กลางแจ้ง นอกสถานะเขตบ้านแห่งอื่น เนื่องจากการศึกษาชั้นนี้ได้แสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนของหนอนพยาธิในดินตัวอย่างที่ได้จากสถานะบริเวณบ้านมากกว่าสถานที่กลางแจ้งอื่น ๆ และรวมถึงการศึกษาตัวอย่างดินจากชุมชนชาวเขาเผ่า กะเหรี่ยงของ我们在ครั้งนี้ ก็พบว่ามีความชุกที่สูงสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับการศึกษาถึงความชุกของการติดเชื้อหนอนพยาธิในชุมชนชาวเขาของ Chaisalee T. และ

Tookaew A.⁽¹¹⁾ ที่ได้ทำการศึกษาในชุมชนดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้

การศึกษาตัวอย่างดินจากชุมชนชาวเขาเผ่า กะเหรี่ยง ณ หมู่บ้านนาอ่องได้ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ในครั้งนี้พบว่าหนอนพยาธิที่มีการปนเปื้อนในดินตัวอย่างมากที่สุดคือ *Ascaris lumbricoides* ซึ่งพบการปนเปื้อนถึง 66.67 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ *Tricurus species* พบรการปนเปื้อนประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการศึกษานี้ก็เป็นไปในทำนองเดียวกับการศึกษาของ Chongsuvivatwong V, et al.^(2,8) ที่ได้ทำการศึกษาไว้ในชุมชนทางภาคใต้ของประเทศไทย ก็พบว่ามีความชุกของหนอนพยาธิทั้ง 2 ชนิดนี้ในดินตัวอย่างมากที่สุดเช่นกัน

จากการศึกษานี้ทำให้เห็นได้ว่า ปัญหาการปนเปื้อนของหนอนพยาธิเหล่านี้ในดิน ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะในชุมชนชนบท ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งของการตรวจพบดังกล่าวอาจเนื่องมาจากพยาธิชนิดดังกล่าวเป็นพยาธิที่พบได้บ่อยในประเทศไทย และจะชีวิตมีการผ่านลงดิน โดย host สามารถถ่ายเอาไข่พยาธิออกมามาได้คราวละมาก ๆ ได้ และชาวเขานั้นมีโอกาสในการสัมผัสกับดินในชีวิตประจำวันค่อนข้างสูง ตลอดจนสุขลักษณะโดยทั่วไปยังไม่ค่อยดี อย่างไรก็ตามไม่พบการปนเปื้อนของ soil transmitted helminthes ชนิดอื่น ๆ ในการศึกษานี้ ซึ่งน่าจะเกิดจากพยาธิเหล่านี้ไม่ใช่พยาธิที่พบได้ประจำถิ่น (endemic)

การศึกษาของเรานี้ได้ศึกษาลงไปในชุมชนชาวเขา เนื่องจากเป็นชนกลุ่มน้อยและด้อยโอกาสทางสังคมอยู่มาก โดยเฉพาะด้านการศึกษาดังนั้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาธารณสุขมูลฐานในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อลดลงจากการติดต่อของพยาธิเหล่านี้จึงมีอยู่น้อยมาก⁽¹¹⁾ ทำให้ปัญหาสุขภาพด้านนี้เกิดขึ้นซ้ำซากและมีอยู่เรื่อยมา ฉะนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐานและการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อหนอนพยาธิยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มาก และสมควรอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรให้ความเอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้อย่างลงและหมดไป

อ้างอิง

1. Xu LQ, Yu SH, Jiang ZX, Yang JL, Lai LQ, Zhang XJ, Zheng CQ. Soil-transmitted helminthiases: nationwide survey in China. *Bul World Health Organ* 1995; 73(4): 507 - 13
2. Uga S, Nagnaen W, Chongsuvivatwong V. Contamination of soil with parasite eggs and oocysts in southern Thailand. *Southeast Asian J Trop Med Public Health* 1997; 28 Suppl 3:14 - 7
3. Saksirisampant W, Wiwanitkit V, Akraraborvan P, Kulkaew K, Nuchprayoon S. Prevalence of intestinal parasites among Thai laborers in a screening program before going aboard. The Joint International Meeting on Tropical Medicine 2001 Aug 8 – 10: Bangkok Thailand. Bangkok, TW System 2001
4. Fact Sheet Office of Communications and Public Liaison, National Institute of Allergy and Infection Diseases, National Institute of Health. Parasitic Roundworm Diseases. Available from: URL: [Http://www.niaid.nih.gov/factsheet/roundworm.htm](http://www.niaid.nih.gov/factsheet/roundworm.htm)
5. Stromberg BE. Environmental factors influencing transmission. *Vet Parasitol* 1997 Nov;72 (3-4): 247 - 64
6. Mukaratiwa J, Taruvinga M. A survey on environmental contamination of suburban parks and playgrounds in Harare, Zimbabwe, with canine helminthes of zoonotic significance.
- J S Afr Vet Assoc 1999 Sep;70(3):119 - 21
7. Alonso JM, Stein M, Chamorro MC, Bojanich MV. Contamination of soil with eggs of *Toxocara* in a subtropical city in Argentina. *J Helminthol* 2001 Jun; 75(2):165 - 8
8. Chongsuvivatwong V, Uga S, Nagnaen W. Soil contamination and infection by soil - transmitted helminthes in an endemic village in southern Thailand. *Southeast Asian J Trop Med Public Health* 1999 Mar; 30(1): 64 - 7
9. Shimizu T. Prevalence of *Toxocara* eggs in sandpits in Tokushima city and its outskirts. *J Vet Med Sci* 1993 Oct; 55(5): 807 - 11
10. Schulz S, Kroeger A. Soil contamination with *Ascaris lumbricoides* eggs as an indicator of environmental hygiene in urban area of Northeast Brazil. *J Trop Med Hyg* 1992 Apr; 95(2): 95 - 103
11. Chalsalee T, Tookaew A. Prevalence of intestinal parasite and factors relating to parasite infection, a study in a hilltribe community. (Dissertation). Bangkok: Chulalongkorn University 2001
12. Nithiuthai S. Diagnostic technique in veterinarian parasitology. Bangkok : Chulalongkorn University Press, 1997
13. van Nickerk CH, Weinberg EG, Shore SC, de Heese H. Intestinal parasite infestation in urban and rural Xhosa children. A comparative study. *S Afr Med J* 1979 May 5; 55(19): 756 - 7

แก้ไขเพิ่มเติม

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ 46 เดือนกันยายน 2545 หน้า 747- 51 เรื่อง “โรคของวิลสันร่วมกับการติดเชื้อตับอักเสบชนิดซี” ขอเพิ่มเติมต้นฉบับดังนี้

Acknowledgement

The author would like to thank everyone who had roles in taking care of this patient including Tesapant N, the other medical personnel & physicians of Prabuddhalerdlahnaphalai Hospital and the referring hospital: without these staffs this case study cannot be existed. The author is thankful to the cousins of this patient who gave all data to the author. Also, the author would like to thank Tantimongkolsuk J, who made the author created the first idea on this case.

ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

บรรณาธิการ