

## Sex Steroids.

นายแพทย์รังษีพัฒน์ อุตสาหะ ณ อยุธยา พ.บ., Dr. Med. (BERNE)

Sex Steroids ทอกล่าวถึง คือ เอสโตรเจน, โปรดีเซลโลโรน และ แอนโกรเยน กำลังสำคัญ

วิธีใช้เอสโตรเจน (ครุยช้อซอร์โนน ตอนสุดท้าย)

ทางปาก ไคลเพตติ กลันเดย ไม่ต้องใช้วิธีขูดในกระเพุ่มแก้ม หรือบนโภคต์ เพื่อหวังผลให้เข้มงวดเข้าในกระเสโลหิต

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ใช้พาก esters ชิบ estradiol ละลายในน้ำมันออกฤทธิ์แรงชัน และอยู่ในร่างกายนาน 功用ชนิดของ ester, อย่างเช่น Estradiol Valerianate ออกฤทธิ์อยู่นานถึง ๓ อาทิตย์

ถู, นวด หรือทา ทำเป็นชิบ ไก่ ประโยชน์ไม่มากนัก จะให้มีเอสโตรเจนมาก ๆ ก็ไม่ได้ อย่างไก่เพียง ๒.๕% dienestrol

เห็นบ ทำเป็น vaginal suppositories ใช้เฉพาะที่

ผึ้งใต้ผิวนัง (pellets) ชนิด stilbestrol ออกฤทธิ์นาน ๓-๕ เดือน ชนิด estradiol ออกฤทธิ์นาน ๙-๑๒ เดือน

การแพ้อสโตรเยน ส่วนมากเกิดจากพวยรับประทาน มีคลื่นใส อาเจีย บางทีป่วยหัว เมื่อย ชัม stilbestrol แพ้มาก diethylstilbestrol หรือ ethinylestradiol แพ้ยิ่งกว่า ส่วนพวกลิม่ๆ เช่น conjugated equine estrogens (Premarin) หรือ Chlorotrianisene (Tace) แพ้ยิ่งที่สุด การแพ้อสโตรเยนมาก่อนอย่างชัดเจน ขนาดของยาที่ใช้ก็ยิ่ง คือให้ขนาดสูงมาก ยิ่งแพ้มาก

อาการแทรกซ้อนของเอสโตรเยน

1. ทำให้มี vaginal discharge มาตรฐาน
2. ทำให้มี vaginal bleeding เป็นแบบ "break through bleeding" คือเลือกออกระหว่าง เวลาที่ให้ เอสโตรเยนอยู่ หรือเป็นแบบ "withdrawal bleeding" คือเลือกออกหลังจากหยุดเอสโตรเยน ๓-๔ วัน
3. เท้านมูก และเรื้บ
4. ผื่นคันทางหัวนมและรูจี
5. น้ำ แสงเกลือ คงใน tissue ของร่างกาย พอกทำให้รู้สึกท้องบีบ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

๖. เร่องทว่าเอสโตรเยน ทำให้เกิด  
เนื่องมะเร็ง เร่องน้ำหรือมนุษย์ยังพัฒนา  
ไม่ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อเอสโตรเยนทำให้  
เกิดอาการแพ้ และมีอาการแทรกซ้อน  
คังกัดๆ ทางทัศนวิชานาคทากลูก พอก  
ให้ได้ผลตามความต้องการ ไม่ใช้รับประทาน  
เกินควร คือควรรับประทานให้ยา และรับประทาน  
ให้เวียนแบบของประจำเดือนให้มากที่สุด  
สำหรับคนไข้ที่ใกล้หมด หรือหมดประจำ  
เดือนแล้ว ถ้ามีเลือดออกผิดปกติ ในพวกล  
แรก หรือเลือดออกเฉย ๆ ในพวกลัง ซึ่ง  
ขณะนั้นกำลังรบกวนการรักษาภัยเอสโตรเยนอยู่  
จะถึงที่ diagnostic curettage เป็นอีก  
เพราะจุว่าเป็นมะเร็งหรือไม่

### โรคต่างๆ ที่ใช้อีสโตรเยน

1. Ovarain agenesis หรือ  
Turner's syndrome รังไข่ไม่เติบโตแต่  
กำเนิด มีลักษณะสำคัญ ๆ คือ

๑. primary amenorrhea

๒. infantile uterus

๓. atrophic vagina

๔. absent labia minora

๕. infantile labia majora

๖. scanty pubic and axillary hair

๗. complete absence of mam-  
mary development

ให้อีสโตรเยนแบบของฤทธิ์ เช่น  
stilbestrol ผึ้งให้ผิวน้ำ 100 mg. หรือ  
estradiol valerenate 10 mg. ชาทิกบ  
ละครง ครง 4 ชาทิกบ ให้ progesterone  
25 mg. วันละ 4-5 ครง ท่อมาอิค 4 วัน  
ก่อนมี progesterone withdrawal bleed-  
ing ทำอย่างน้อยครบทุกครั้ง คนไข้จะนิ  
เดียกออกอย่างสมดุล ทำให้รู้สึกว่ากัวเองมี  
ประจำเดือนเหมือนสุกรทุกๆ ไป เท่านั้นก็จะ  
เก็บโถชัน ถูกของเอสโตรเยนจะเห็นผล  
ภายในหลังใช้อีสโตรเยนตกต่อกัน 1-2 ปี  
เท่านั้นจะไม่กลับเล็กลงหรือหายไป เมื่อยก  
ให้อีสโตรเยน นอกจากนี้จะบวบพุง  
ทุกๆ ส่วน รวมทั้งข้นก์เรียวเทินโภชนาภา  
เดิม

เช่นท่านสังเกตว่า ในกรณี Turner's  
syndrome เอสโตรเยนสามารถทำให้  
เท้านมเรียวเทินโภชนาไป แต่สำหรับสตรี  
ที่มีร่างกายปกติ, มีรังไข่ปกติ เสียแท้ร่าง  
เท้านมเล็กไปอย่างจะให้ใหญ่ขึ้น การใช้  
เอสโตรเยน เพื่อกำรคุ้นให้เท้านมเติบโตจะ  
ไม่ได้ผลเลย

Climacteric and postmenopausal  
condition อาการร้อนซื้ชา ฯลฯ vaso-

motot disturbance จะเป็นเพราะ gonadotropin มีคุ้งค้างในร่างกายมากเกินไป หรือ ร่างกายขาดเอนโดโรเจน ไม่รู้สึกแน่นชัก การใช้อีสโตรเจนเสริมเข้าไป ไก้ผลคิมาก ใช้ชั้นตากน้อย ๆ เช่น 1 mg. stilbestrol ต่อ ๑ วัน ต่อไปลดลงเรื่อยๆ ถึง ๐.๒๕ mg. ต่อหนึ่งวัน ระยะการใช้อีสโตรเจนให้ติดต่อ ทกวัน ๔ - ๖ อาทิตย์ และพัก ๗ - ๑๐ วัน จึงเริ่มใหม่

พวก chlorotrianisene (Tace) จะซึมไปอยู่ใน fat depots มากนักอยู่ ๆ ผ่อนคลายไปใช้ก่อร่างกายคล้ายมาลากรัง ใช้ตอนจะหมดประจำเดือน ไม่มีอาการแทรกซ้อน ชนิด withdrawal bleeding ด้วย

เอสโตรเจน รวมกับ แอนโกรเจน ใช้เป็นทันยมมาก เม็ดหนัง estrynlestradiol ๐.๐๑ mg. และ methyltestosterone ๓ mg. รับประทานไกดิจ ๖ เม็ด ต่อหนึ่งวัน โดยไม่ทิ้งกลัวจะเกิด hirsutism

Senile kaerosis และ atrophic vaginitis ใช้อีสโตรเจน แบบเฉพาะที่เห็นบุหรือถู หรือทา ไก้ผลคิมาก

Senile osteoporosis เอสโตรเจนจะเพิ่ม activity ของ osteoblasts ช่วย lay down protein in bony matrix และกัว

มาก calcium phosphate จะมา deposit ได้

### 3. Menstrual disorders.

#### a. Amenorrhea

1. การให้อีสโตรเจน และ โปรเจสเทอโรน เวียนแบบ normal menstruation ไก้ผลคิมาก คือให้อีสโตรเจน ๒๑ วัน และให้โปรเจสเทอโรน ๗ วัน สุกทัย เช่น ทัวอย่าง ให้อีสโตรเจน (stilbestrol ๐.๕- ๑ mg./หนึ่งวัน) วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๑ และให้โปรเจสเทอโรน (ethisterone ๒๕ mg./หนึ่งวัน) วันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๑๑ ของปีระกา เก้อน หยุดยาทงสองนั้นพร้อมกัน ต่อมาอีกประมาณ ๗ วัน ก่อภูมิเลือกออก

7. การให้อีสโตรเจน (estradiol benzoate ๒ mg.) กับโปรเจสเทอโรน (progesterone ๒๐ mg.) รวมกันละลายในน้ำมัน ฉีดเข้ากล้าม วันละครึ่ง สักวัน ก็อกกัน จะทำให้มี withdrawal bleeding ๔ - ๗ วัน ต่อมา ถ้าหาย amenorrhea ระยะสั้น ๆ เช่น ๒ - ๓ เดือน จะใช้แบบไก่ ก่ำตาม ควรร่าວด basal temperature เพื่อความ ovulation หรือไม่ เมื่อไรมี ovulation ก็นับว่าไก้ผล ต้องระวังว่าจะใช้มากไปจะ inhibit ไม่ให้เกิด ovulation เช่นกัน

### ๑. Dysmenorrhea.

ให้เอสโตรายนเพื่อ inhibit pituitary function ไม่ให้ขับ gonadotropins ไม่ให้เกิด ovulation, ไม่มี progesterone production และไม่มีอาการปวดประจำเดือน ใช้ stilbestrol 2 mg. ท่อหูหงัว ทุก ๆ วันติดต่อ กัน เริ่มวันที่ 5 ของประจำเดือน จนถึงวันที่ 21 ของประจำเดือนแล้วหยุด 7 วัน ท่องมา้มเลือกออก ไม่ปวดท้องเลย การใช้ เอสโตรายน แบบนี้จะช่วยให้การเกิด เลือกเมื่อไรก็จะมี ovulation ตามปกติ

### ๒. Metropathia Hemorrhagica.

เพียงให้เลือกหยุด ให้เอสโตรายน เช่น stilbestrol 5 mg. หรือ ethinylestradiol 0.2 mg. ทุก ๆ 2 ชม. เลือกจะหยุดใน 24-36 ชม. หรือให้ conjugated equine estrogens "premarin" 20 mg. ระยะเวลา ในน้ำนมเข้าเส้นโดยทั่วไป 4-12 ชม. เลือกหยุดเร็วกว่า เหลือผล ก่อ เอสโตรายนที่เป็น ไนนัส ซึ่งเสริมระดับ เอสโตรายน ของร่างกายให้สูงกว่าระดับ bleeding with drawal bleeding ก่อให้หยุดลงชั่วคราว

### ๓. Endometriosis.

ให้เอสโตรายน เพื่อบรรเทา ความ ปวด โดยหลัก เดียว กับการรักษา อาการปวดประจำเดือน

### ๔. Disorders of Pregnancy.

หลายมีมาแล้ว ให้ก็คล่องใช้เอสโตรายน กับโรค เกี่ยวกับ การ คง ครรภ์ หลายอย่าง เดียว ไม่เป็น ทันยม เพราะ ไม่ได้ผล เป็นที่ พัฒนา คังชั่น ในกรณีที่ต้องปั้น induction of labour, การแก้ uterine inertia, pregnant diabetics, toxemia หรือ eclampsia, threatened or habitual abortion

### ๕. Lactation.

เอสโตรายนขนาดสูง จะ inhibit pituitary ไม่ให้ขับ lactogenic hormone ใช้ stilbestrol 15 mg. ท่อวัน ประมาณ 4-5 วัน ถ้ามีคัดเสียแล้วก็จะ ให้เอสโตรายนนานไปอีกหน่อย

### ๖. Cancer of the breast and prostate.

Breast มะเร็งชนิดที่ทำการผ่าตัดไม่ได้ ให้เอสโตรายน เช่น 15-50 mg. stilbestrol ท่อวัน ซึ่งให้ primary growth หรือ ส่วนที่สามออกไปให้เลือดลงหรือคงเดิม ซึ่งยัง รังสีความปานกลางตามถึงกระดูก

Prostate ใช้ขนาด เอสโตรายน เช่น เก็บ กันสำหรับ breast บางที่จะซึ่งทำให้ห้อง ถุงขนาดเล็กลง สามารถทำผ่าตัดได้ ภายในหลัง

### 7. In the male

เอสโตรเจน มีประโภชน์ในผู้ชายทำให้มาก ใช้นาน ๆ จะเกิด gynecomastia, pigmentation of the nipples, testicular atrophy และ diminished frequency of erection พวก acne เอสโตรเจนจะทำให้ seborrhic secretion ของผู้หญิงขึ้นอย่างให้ stilbestrol 1 mg. ต่อวัน พวกผู้ชายที่มีความรู้สึกทางเพศมากกว่าธรรมชาติ จะสักดีโดยให้อีสโตรเจน เช่น stilbestrol 15 mg. ต่อวัน ให้นาน ๆ ถ้าหากความรู้สึกเลย

### 8. Miscellaneous.

1. Cervical mucous จะใส่แล้วออกมี ovulation และเป็นสื่อพา spermatozoa เข้าไปได้ หากไม่รับการกระตุ้นจากเอสโตรเจนพอเพียง ตั้งนั้นเราใช้อีสโตรเจนช่วย เช่น ให้ stilbestrol 0.25 mg. ต่อวัน ใน 14 วันแรกของประจำเดือน

2. Bucco- (vulval) ulceration เกิดขึ้นประมาณ 7 วัน ก่อนมีประจำเดือน และหายไปเมื่อหมดประจำเดือน แสดงว่าเป็น condition เกี่ยวกับขนาดอีสโตรเจนควรให้ stilbestrol 0.25 mg. ต่อวัน ระหว่าง 21 วัน แรกของประจำเดือน

### Progesterone

1. Natural สกัดจากรังไข่หมูเปลี่ยนเป็น esters เช่น benzoic หรือ propionate ของฤทธิ์ในร่างกายนานขึ้น ใช้ละลายในน้ำมันดินเชากัดามเนธิ

### 2. Synthetic

ก. จาก cholesterol หรือ stigmasterol (plant sterol มีในถั่วเหลือง)

ข. ทำจาก testosterone หรือ progesterone ซึ่งทางเคมีบางชนิดเช่น pregnenolone, ethinyltestosterone หรือ auhydro-hydroxyprogesterone, ซึ่งฤทธิ์โดยรับประทาน ขนาดเทียบกันมีขนาดเทียบเท่าหนึ่งในทางของ progesterone ฉะนั้นขนาดเล็กกว่า

Norethisterone (ethinyl - 19-norethisterone) ทำให้รับประทาน ให้ฤทธิ์มากกว่า ethisterone เท่าครัว

### วิธีใช้โปรเจสเตอโรน

ก. ทางปาก

ข. ฉีดเข้าเนื้อกล้าม

ค. ทางอุจจาระ เช่น ยาเส้น-โลหิต หรือวางแผนในช่องคลอด เป็นต้น

โรคต่างๆ ที่ใช้โปรเจสเตอโรน

1. โรคเกียวกับการตั้งครรภ์ เช่น

threatened abortion, habitual abortion ตามทฤษฎีความเสี่ยงให้ประจำไปชนน้ำมาก เพราะประจำสูญโภตุ คือ ยอดมูนสำหรับการมัครรภ์ เมื่อจากเราไม่สามารถดูความลอกคนหนาบาง ของความเสี่ยหายของรัก หากเสี่ยหายมาก เช่นหลุดมา ก็ประจำโภตุโดยย่อมช่วยไม่ได้เลย เนื่องจากประจำตัวไว้ความว่าคนใช้ชาประจำประจำโภตุมากอย่างนั้น การเติมให้ควรไก่ผัดก็

สรุปแล้ว เราคงใช้ประจำโภตุโดย ขนาดสูง ของการดูดูดาน เช่น progesterone caproate 250 mg. ทุกๆ 1, 2 หรือ 4 อาทิตย์ ตามความรุนแรงของโรค ถ้าแม่ผลที่ควรจะได้มีค่อยเป็นทพอยกันนัก และสำคัญยังคงไม่ได้ ก็ต้องบังคับให้คนไข้อยู่นั่น ๆ กับเที่ยง และให้ยาสักครึ่วครับ

2. ใช้ปรับประจำเดือนให้มาเป็นประจำเป็น ควรใช้ควบคับยอสโตรเจน เช่นประจำเดือนมาซ้า (oligomenorrhea) ให้ ethinylestradiol 0.05 mg. ก่อหน่วง กับ ethisterone 10 mg. วันละ 3 ครั้ง วันที่ 15 ถึงวันที่ 24 ของประจำเดือน ก่อมา 4 วันก่อนจะมีเดือนออก หมายความว่ามีประจำเดือนทุก 28 วัน ถ้าได้ให้ยาเช่นนี้ในสัปดาห์ที่ 3 เดือนอย่างน้อยประจำเดือน

ควรจะเป็นไปตามปกติ ของมันเอง หลังจากเด็กยาแล้ว

ถ้าประจำเดือนมาเร็วสมอๆ (polymenorrhoea) เช่นทุกๆ 21 วัน การให้ยาตามแบบคงล้าวข้างบนก็ได้ ก็ เพราะประจำสูญโภตุสามารถประวิง bleeding ทราบ ให้เราจังเก็ติมให้ร่างกายชี้ ถ้าเมื่อเราให้ระหว่าง วันที่ 15 ถึงวันที่ 24 ของประจำเดือน ระหว่างนั้นจะไม่มี bleeding ตาม withdrawal bleeding ภายในหลังหยุดยา 4 วัน ก็กลับมาข้างบน

### 3. Dysfunctional uterine bleeding

a. แบบ ovular type คือมีไข่สุก และเนื้อ endometrium เป็นชนิด secretory เดือดบ่อมหยดไก่เจ่อง ไม่มีความสำคัญในการรักษาควบคุมร้อน

b. แบบ non-ovular type คือ ไม่มีไข่สุก เนื้อ endometrium เป็น proliferative เดือดออกชนิดที่เรียกว่า nutrofathia hemorrhagica ชนิดนี้ให้ประจำโภตุโดย progesterone ในน้ำมัน 20 mg. ก่อ 1 วัน ๆ ละครั้ง หรือให้ ethisterone รับประทาน 60–120 mg. ก่อหน่วงวัน 1 ครั้ง 5 วันเดือนหยุด เราก็จะให้อย่างไก่ อย่างหนึ่งก่อไปอีก 5 วัน เมื่อยกยาแล้ว ก่อมา 4–7 วัน จะมีเดือนออกครั้งเป็น

เลือกออก ตาม ลักษณะ ของ ประจำเดือน-  
ธรรมชาติ น่าสังเกต ว่า เราให้ progesterone 24-36 ช.ม. ส่วน progesterone caproate  
ทุกครั้ง ระหว่าง 10 วัน คือ ให้ขณะเดือนออก  
ในเดือน ก่อน แล้ว ให้ ก่อไป ประมาณ 4-7 วัน  
เลือกออก ใหม่ อก ดังนั้น เราจะ ถอย ออก  
คนไข้ ให้รู้ ว่า ถูก เลือก ทุก ครั้ง ใหม่ ก่อน หลัง  
จะ ได้ ไม่ ตก ใจ เลือก ออก ก่อน หลัง คือ  
progesterone withdrawal bleeding  
ส่วน การรักษา ด้วย progesterone แบบ  
เราเรียกว่า medical curettage

สำหรับ เพื่อ ระยะ กัน ไม่ ให้ โรค กัน แบบ เช่น  
ใหม่ ใน เดือน ก่อไป อีก 3 เดือน พอดัง วันที่  
15 เราก็ เริ่ม ให้ progesterone ตาม ขนาด  
คง ถ้วน ต่อ วน กัน 24 ของ ประจำเดือน  
แล้ว ก่อ 4-7 วัน ก่อน ให้ progesterone  
withdrawal bleeding

ข้อ ที่ บีบ ผู้ มี ประจำเดือน กว้าง estradiol  
benzoate 10 mg. รวม กับ progesterone  
caproate 125 mg. หรือ 250 mg. ละ ถาย  
ใน น้ำ สำหรับ ผู้ ที่ ไม่ สามารถ ใช้ รูป ไม่  
รวม กับ สำหรับ glandular cystic  
hyperplasia ซึ่ง พยาย ยัง ที่ สำคัญ ใน พฤก  
dysfunctional uterine bleeding action  
ของ estradiol benzoate จะ บีบ กับ  
ของ estrogen ใน ร่างกาย ให้ สนับสนุน (เกิน  
ก็ มี อยู่ มาก แล้ว) ที่ คือ มา ลด ลง นั่น ดัง ระดับ

bleeding (เลือก จึง ออก) เลือก ประจำเดือน  
ใน ธรรมชาติ น่าสังเกต ว่า เรา ให้ progesterone 24-36 ช.ม. ส่วน progesterone caproate  
ทุก ครั้ง ระหว่าง 10 วัน คือ ให้ ขณะเดือนออก  
ในเดือน ก่อน แล้ว ให้ ก่อไป ประมาณ 4-7 วัน  
เลือก ออก ใหม่ อก ดังนั้น เราจะ ถอย ออก  
คนไข้ ให้รู้ ว่า ถูก เลือก ทุก ครั้ง ใหม่ ก่อน หลัง  
จะ ได้ ไม่ ตก ใจ เลือก ออก ก่อน หลัง คือ  
progesterone withdrawal bleeding  
เช่นเดียวกัน

การ ใช้ เอสโตรเจน และ โปรดีสเทอโรน  
เวียน แบบ ประจำเดือน ก่อ หรือ ใช้  
เอสโตรเจน รวม กับ โปรดีสเทอโรน เช่น ครอง  
ก่อ ไก่ ผล ต มาก กอง กล่าว แต่ ต้อง ไม่ ลืม ว่า  
ใน สตรี อายุ ใกล้ 40 ปี ต้อง ทราบ เนื่อง  
endometrium เสีย ก่อน ว่า ไม่ เปลี่ยน มะเร็ง  
ใช้ ยา โน่น รักษา ได้

## Androgens

### Androgen Preparations

1. Methyltestosterone รับ ประจำเดือน  
ขนาด 5-10 mg.

2. Testosterone propionate  
ละ ถาย ใน น้ำ นั้น คือ เข้า เนื้อกล้าม ขนาด  
10-25 mg.

3. Testosterone isobutylate  
Testosterone phenyl propionate  
Testosterone enanthate ทั้ง สาม

ชนิดคละลายในน้ำมัน ฉีดเข้าเนือกล้ามขนาด 100-250 mg. ออกฤทธิ์นานถึง 4-6 อาทิตย์

4. Preparation ใหม่ ๆ เป็นพูก steroid ซึ่งมี less androgenic property และมี protein anabolic activity เป็นสำคัญ เช่น 19 nortestosterone phenyl propionate ทำคละลายในน้ำมัน ฉีดเข้าเนือกล้าม ขนาด 25-50 mg. ต่อ 1 c.c. ทาง clinical เราใช้ androgen ในกรณีที่ต่าง ๆ มากมาย แต่ผลที่ได้จะต่างกัน ผู้ชายที่รับยาเป็นผลกำไรที่สูง ผู้หญิงที่รับยาเป็นผลกำไรที่ต่ำ แต่ก็มีประโยชน์มาก เราสามารถเทียบผลกันได้โดยใช้ค่าที่ต่อไปนี้:-

ค่ามาก การณฑ์ของ androgen และโดยเฉลี่ยผู้ชาย เช่น Primary male hypogonadism

ค่าใช้เป็น antagonist ที่อยู่ร่วมกัน เช่น เอสโตรเจนในสตรี

ผลใช้ ใช้เพื่อห่วงผลทาง protein anabolic action

การใช้ androgens เป็น Estrogen Antagonists

5. Excessive uterine bleeding เช่นเป็น dysfunctional uterine bleeding แบบ non-ovular type ใน endometrium มี proliferation ขยายเกิน

Androgens ช่วย tone ของเนือกล้ามของมดลูก ให้ข้นมาก ๆ เช่น methyltestosterone 25 mg. ต่อวัน ใช้มากและนานไม่ได้ แก้ไขภาวะ hirsutism อย่างนานใช้ได้ 3 เดือน คงนั้นจังไม่นาน

6. Endometriosis ทำให้เนื้อ endometrium ซึ่งไปอยู่ผิดที่เหยวลง ทำให้ความบวบก้อนอยลง หรือหายไปโดยใช้ methyltestosterone 25 mg. ต่อวัน ส่องกล้อง ก้อนจะมีประกำเกอน วันใช้ระยะนานไม่ได้ จึงไม่เหมาะสม

7. Pre-menstrual tension ให้มethyltestosterone 10-25 mg. ต่อวัน 5-7 วัน ก่อนมีประจำเดือน ช่วยระงับอาการทางระบบประสาท และทางจิตใจ

8. Dysmenorrhea ให้มethyltestosterone 25 mg. ต่อวัน จะทำให้เกิด anovulatory menstruation และไม่บวบ ใช้เรื่อยๆ ไป ยอกเกิดกลักษณะผู้ชาย

9. Frigidity ช่วยกระตุ้นให้มีความรู้สึกทางเพศ คิดพะสตรี ให้มethyltestosterone 15 mg. ต่อวัน ติดต่อ กัน เช่นรักษานานประมาณ 2-3 อาทิตย์ ต่อครั้ง หรือใช้ testosterone 100 mg. เดือนละ 1 ครั้ง

๑. Post partum breast engorgement. androgen ช่วยให้ความบึ่งปัวกัดอ่อนลง ถ้านมคั้น แต่ไม่ทำให้น้ำนมขยับลง ถ้าเกิดยังคงนมต่อไป ใช้ methyltestosterone วันละ 10-15 mg. ในการปัวกัดหมาดๆ ไป

๒. Mastalgia ก่อปัวกัดหมาดๆ chronic mastitis ใช้ androgens มากๆ ช่วยความบึ่งปัวกัด แต่ไม่เหมาะสม เพราะจะเกิดลักษณะผู้ชาย

๓. Carcinoma of breast ใช้ oxandrolone 25 ถง 100 mg. ของ testosterone propionate ฉีดเข้าเนืออกล้ามชาทิพย์ละ 3 ครั้ง ถ้าจะให้ methyltestosterone ใช้ 100 mg. ทุกหนึ่งวัน ถ้องให้ติดต่อ ก็ให้ไม่หยุด ผลลัพธ์จะดี ก่อ หายปัวกัด, อายากอาหาร, น้ำหนักขึ้น มะเร็งกล้ามปีกหอนจะเล็กลง มันไม่ช่วยยกชีวิตไปได้ เนื่องจากในตัวมีไข้ เนื่องจาก salt และน้ำค้างในร่างกาย ระวังการใช้กับคนไข้ที่เป็น congestive heart failure ใช้มากมันสกัด spermatogenesis มันทำให้ cancer of prostate เดวกว่าเดิม รวมทั้งมะเร็งท่อนมเป็นในผู้ชาย และทำให้เกิด jaundice.

การใช้ androgen เป็น protein anabolic hormones.

๑. Senile osteoporosis-protein anabolic hormone หรือนยหัน androgen ช่วย deposition ของ calcium บน bone matrix ผลลัพธ์ดีมาก

๒. Cushing syndrome การรักษาด้วยท้องใช้ผ้าหัด ถ้ามี loss of protein จะให้ androgen ก็ได้

๓. Addison's disease ใช้ androgen ช่วยบังกัด แต่ corticoid hormones ถูกท้องกว่า

สรุป ต้องระวังการเปลี่ยนแปลงของเพศ เมื่อจะใช้ androgen กับสตรี จะทำให้บวมเน่องจาก salt และน้ำค้างในร่างกาย ระวังการใช้กับคนไข้ที่เป็น congestive heart failure ใช้มากมันสกัด spermatogenesis มันทำให้ cancer of prostate เดวกว่าเดิม รวมทั้งมะเร็งท่อนมเป็นในผู้ชาย และทำให้เกิด jaundice.

### Sex Steroids ทันตฯ

ชื่อ	คุณสมบัติ	ชนิด และขนาด
Estradiol benzoate. Estradiol dipropionate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— เป็น ester ของ estradiol</li> <li>— ออกฤทธิ์ค้างในร่างกายนานกว่า และดีกว่า estradiol.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— ละลายในน้ำมัน</li> <li>— ขนาด 1-2-5-10 mg.</li> </ul>
Estradiol cyclopentyl-propionate. Estradiol Valerenate	<ul style="list-style-type: none"> <li>— ออกฤทธิ์ในร่างกายนานกว่าชนิด ทึ่กถ้วนชั่วบัน.</li> <li>— ออกฤทธิ์ในร่างกายนานถึง 3-4 อาทิตย์.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— ละลายในน้ำมัน.</li> <li>— ขนาด 10 mg.</li> </ul>
Stilbestrol. Diethylstilbestrol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— synthetic estrogen.</li> <li>— ใช้รับประทานได้ผลดี.</li> <li>— ชนิดแรกทำให้เหงยามากกว่า ชนิดหลัง</li> <li>— ราคาถูก.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— เม็ด.</li> <li>— ขนาด 1-5 mg.</li> </ul>
Ethinylestradiol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— synthetic estrogen</li> <li>— ออกฤทธิ์แรง และแน่นอน</li> <li>— ใช้รับประทาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— เม็ด.</li> <li>— ขนาด 0.01-0.02 mg.</li> <li>„ 0.01-0.02 mg.</li> </ul>
Chloratria-nisene “TACE”	<ul style="list-style-type: none"> <li>— synthetic estrogen</li> <li>— absorb fat globule มี action ท่อร่างกายช้าๆ และนาน.</li> <li>— แบบ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— capsule</li> <li>— ขนาด 12 และ 25 mg.</li> </ul>
Conjugated equine estrogens. “PREMARIN”	<ul style="list-style-type: none"> <li>— สกัดจากน้ำส坐落于ม้ามีครรภ์.</li> <li>— water soluble</li> <li>— ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดได้.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— เม็ด.</li> <li>— ขนาด เม็ดละ 2.5 mg.</li> <li>— ละลายในน้ำ 20 mg.</li> </ul>
Progesterone benzoate ทวาร Propionate	<ul style="list-style-type: none"> <li>— เป็น ester ของ progesterone</li> <li>— ออกฤทธิ์ค้างในร่างกายนาน 3-4 วัน.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— ละลายในน้ำมัน.</li> <li>— ขนาด 5-10-20 mg.</li> </ul>
Progesterone caproate	<ul style="list-style-type: none"> <li>— ออกฤทธิ์นาน 3-4 อาทิตย์ ในร่างกาย.</li> <li>— เป็นชนิด มี prolonged action.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— ละลายในน้ำมัน.</li> <li>— ขนาด 125-250 mg.</li> </ul>

ชื่อ	คุณสมบัติ	ชนิด และขนาด
Ethisterone	<ul style="list-style-type: none"> <li>— compound ทำจาก testosterone หรือ progesterone.</li> <li>— ออกรุทธิ์ได้เร็วและแรง.</li> <li>— potency ดีกว่า ethisterone เท่าทัว.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— เม็ด.</li> <li>— ขนาด 5-10 mg.</li> </ul>
Nor ethisterone (17-alpha-ethynyl-19-norethisterone)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— ester ของ Testosterone</li> <li>— ออกรุทธิ์ในร่างกายนานพอสมควร.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— เม็ด.</li> <li>— ขนาด 5-10 mg.</li> </ul>
Testerone propionate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— synthetic testosterone</li> <li>— ให้รับประทาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— ละลายน้ำมัน.</li> <li>— ขนาด 25 mg.</li> </ul>
Methyl testerone	<ul style="list-style-type: none"> <li>— synthetic testosterone</li> <li>— ให้รับประทาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— เม็ด.</li> <li>— ขนาด 5, 10, 15 mg.</li> <li>— เม็ด อม ขนาดเดียวกัน.</li> </ul>
Testosterone enanthate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— ออกรุทธิ์นานในร่างกาย 3-4 อาทิตย์.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— ละลายน้ำมัน.</li> <li>— ขนาด 100-250 mg.</li> </ul>