

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

คุณค่าในการวินิจฉัยโรคเนื่องจากภัยในช่องกะโหลกศีรษะ

ทองจันทร์ วงศ์ลดา ^{*}

อรัส สุวรรณเวลา ^{**}

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเป็นการตรวจเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าบนศีรษะ ใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรคทางประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์ได้หลายชนิด โดยเฉพาะโรคลมชัก สำหรับทบทวนของการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ในการวินิจฉัยโรคเนื่องจากภัยในช่องกะโหลกศีรษะนั้น ยังเป็นทักษะที่มีอยู่มาก ในเบื้องต้นความแม่นยำและประโยชน์ที่ได้

รายงานนี้ เป็นการศึกษาผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ป่วยด้วยโรคเนื่องจากภัยในช่องกะโหลกศีรษะ ๖๔ ราย เพื่อวิเคราะห์หาความแม่นยำของวิธีการตรวจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ป่วยด้วยเนื้องจากภัยในช่องกะโหลกศีรษะ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำโดยใช้เครื่องตรวจของ

Grass แบบ ๙ ช่อง โคล์ไซด์ electrode ๙ อันทั้ง unipolar และ bipolar

ผล

ในการวินิจฉัยโรค ผลการตรวจจะจำแนกผลได้เป็นระดับต่างๆ ซึ่งความแม่นยำของการตรวจแตกต่างกัน

๑. ความแม่นยำในระดับที่บอกว่าผิดปกติหรือไม่ ในการใช้วิธีการตรวจ เป็นการตรวจ screening เพื่อกลั่นกรองแยกผู้ป่วย สำหรับการตรวจพิเศษขั้นตอนต่อไป ผู้ป่วยที่มีอาการ ทำให้สงสัยว่าเป็นเนื้องจากภัยในช่องกะโหลกศีรษะนั้น จะเป็นต้องแยกออกจากโรคอื่น ที่มีอาการคล้ายคลึงกัน เช่น โรคจิตประสาท และโรคภัยนอกระบบประสาทเบนทัน ตารางที่ ๑ แสดงผล

* แผนกประสาทวิทยาและจิตเวช ร.พ. จุฬาลงกรณ์ และแผนกแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** แผนกศัลยศาสตร์ ร.พ. จุฬาลงกรณ์ และแผนกแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	จำนวน	ผลผิดปกติ	ผลปกติ
รวมทั้งป่วยหงษ์แมด	๖๙	๕๗ (๘๕%)	๑
เนื้องอกในช่อง supratentorial	๔๙	๔๙ (๕๐%)	๐
เนื้องอกในช่อง infratentorial	๑๐	๑๐	๐
เนื้องอกของต่อม pituitary	๓	๐	๓
เนื้องอก acoustic	๑	๑	๐

ตารางที่ ๑ แสดงผลการตรวจคุณไฟฟ้าสมอง ในแบบที่บอกรวบรวมกับผิดปกติหรือไม่.

ของการตรวจคุณไฟฟ้าสมองในแบบที่บอกรวบรวมกับผิดปกติหรือไม่ จะเห็นได้ว่า ในผู้ป่วยเนื้องอกภายในช่องกะโหลกศีรษะ ๖๙ ราย การตรวจคุณไฟฟ้าสมองบอกว่า ผิดปกติถึง ๕๗ ราย หรือร้อยละ ๗๙

เมื่อแยกผู้ป่วยตามตำแหน่งของเนื้องอก แล้วจะเห็นว่าทางเนื้องอกในตำแหน่ง supratentorial และ infratentorial ให้ผลผิดปกติมาก แต่เนื้องอกที่ต่อม pituitary ให้ผลปกติทั้ง ๓ ราย

๒. ความแม่นยำในการดับเบลต์
ตำแหน่งของเนื้องอก ตารางที่ ๒ แสดงการแยกจำนวนผู้ป่วยตามลักษณะผิดปกติที่ตรวจพบ ในผู้ป่วยที่ทำการตรวจคุณไฟฟ้าสมองให้

ผลผิดปกติ ๕๗ รายนี้ ลักษณะมีผิดปกติทั่วไปทั้งศีรษะ บ่งตำแหน่งไม่ได้ ๒๑ ราย หรือร้อยละ ๓๗ มีลักษณะผิดปกติเฉพาะที่ บอกตำแหน่งได้ถูกต้องตรงกับตำแหน่งที่จริงของเนื้องอก ๓๐ ราย หรือร้อยละ ๕๒ มีลักษณะผิดปกติเฉพาะที่ แต่บอกตำแหน่งผิดที่ไป ๖ ราย หรือร้อยละ ๑๐

สำหรับเนื้องอกในช่อง supratentorial ที่ตรวจพบผิดปกติ ๔๔ รายนี้ เป็นความผิดปกติเฉพาะที่บอกตำแหน่งได้ถูกต้อง ๓๐ ราย หรือร้อยละ ๙๔ ของเนื้องอกในช่อง แต่เดียวกัน แสดงว่าการตรวจคุณไฟฟ้าสมองได้ประโยชน์พอใช้ได้ในการบอกรตำแหน่งของเนื้องอกในช่อง supratentorial ส่วนเนื้องอกในช่อง infratentorial หรือ acoustic

การตรวจคุณไฟฟ้าสมอง

203

	จำนวนที่ตรวจ ผลผิดปกติ	ผิดปกติ ทั่วไป	ผิดปกติเนพาะ ที่ (ตำแหน่งถูก)	บวก ตำแหน่ง นัด	หมายเหตุ
รวมผู้ป่วยที่ตรวจผลผิดปกติ	๕๗	๒๑ (๓๗ %)	๑๐ (๑๗ %)	๖ (๊๐ %)	
เนื้องอกในช่อง supratentorial	๔๔	๕	๑๐	๕	มี spike เนพาะที่ ๕ ราย
เนื้องอกในช่อง infratentorial	๑๐	๕	๐	๑	
เนื้องอกของต่อม pituitary	๐	๐	๐	๐	
เนื้องอก acoustic	๓	๑	๐	๐	

ตารางที่ ๒ แสดงการแยกจำนวนผู้ป่วยตามลักษณะผิดปกติที่พบในการตรวจคุณไฟฟ้า

สมอง.

จากการตรวจคุณไฟฟ้าสมองบวกได้ ๔๗ คดี ผิดปกติ แต่เป็นการผิดปกติโดยทั่วไปของตำแหน่งไม่ได้

สำหรับเนื้องอกในช่อง supratentorial ที่บอกตำแหน่งได้ถูกต้องนั้นส่วนใหญ่เป็น focus ของ slow wave มีอยู่ ๕ ราย ที่มี spike ด้วยทำให้สามารถบอกตำแหน่งได้แม่นยำขึ้น

ผู้ป่วยด้วยเนื้องอกในช่อง supratentorial นมอาการชาตัวอย่าง ๗ รายผลการตรวจคุณสมองพบว่าปกติ ๒ ราย และผิดปกติ ๕ ราย ในรายผิดปกตินั้นบอกตำแหน่งได้ถูกต้องทั้ง ๕ รายโดยเดียวกับ slow wave focus ถูกต้องตาม

ตำแหน่งของเนื้องอก ในผู้ป่วยที่มีอาการชาทั้ง ๗ รายนี้เพียง ๗ รายนี้เพียง ๒ ราย ที่มี spike ให้เห็นในการตรวจคุณไฟฟ้าสมอง

ตารางที่ ๓ แสดงรายละเอียดของผู้ป่วยที่ทำการตรวจคุณไฟฟ้าสมองให้ผลบวกตำแหน่งของเนื้องอกผิดปกติ ๗ ราย หรือร้อยละ ๑๐ ของผู้ป่วยที่ทำการตรวจนัดขึ้นมาผิดปกติจะเห็นได้ว่า ๓ รายเป็น metastatic carcinoma ซึ่งเป็นที่ cerebral hemisphere การบอกตำแหน่งที่ถูกต้องของเนื้องอกเราใช้การตรวจพิเศษชนิดนี้โดยเฉพาะ cerebral angiogram และการผ่าตัดก็ตำแหน่งดังกล่าว

ผู้ป่วย	ชนิดของเนื้องอก	ตำแหน่งของเนื้องอก	ตำแหน่งที่กลับไฟฟ้าผิดปกติ
ว.พ.	Metastatic carcinoma	posterior frontal	parietal focus
อ.พ.	Metastatic carcinoma	parietal	frontal focus
ธ.ล.	Metastatic carcinoma	parietal	frontal focus
ส.ส.	Meningioma	frontal	central focus
ว.น.	Glioblastoma multi-forme	parieto – occipital	anterior temporal focus
บ.ศ.	Astrocytoma	cerebellum	right temporal focus

ตารางที่ ๓ แสดงรายละเอียดของผู้ป่วยที่ทำการตรวจคุณสมบัติให้ผลออกตัวแทนของเนื้องอก
ผิดปกติ

๙๔๑ ตำแหน่งของเนื้องอกในไขสูญโดยที่จะเป็นตัวแทนของเนื้องอกในไขสูญ โดยที่ metastatic carcinoma มักจะมีอยู่ในเนื้องอกในสมองหลายตำแหน่ง ผู้บวบหง ๓ รายงานว่ามีก้อนเนื้องอกขนาดเล็กในตำแหน่งที่คลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ เพราะเนื้องอกก้อนเด็กสามารถครอบคลุมการทำงานของสมองได้ การบอกตำแหน่งผิดหง ๓ รายงานว่าอาจไม่ใช่ความผิดของกระบวนการตรวจคุณสมบัติไฟฟ้าสมอง ส่วนอีก ๓ รายคือเบ็นการบอกผิดหงที่จริงซึ่งหากันร้อยละ ๕ ของผู้ป่วยที่ทำการตรวจนั้นข่าวผิดปกติที่พบ

พบลักษณะที่ผิดปกติได้ต่าง ๆ หลายอย่าง (1, 2, 4, 6) ได้แก่

๑. ความผิดปกติทั่วไปทั่วไป

ส่วนใหญ่ในรูปของ slow activity หรือ diffused dysrhythmia ทว่าไปทั่วไปจะมีอยู่ในรูปของความดัน ภายในช่องกระเพาะศีรษะ หรือจากการเปลี่ยนแปลงระดับการรักษาหรือจากการเลื่อนท่อนของสมอง (herniation) ทำให้ระบบต้องทำงานของสมองส่วนกลาง คลื่นไฟฟ้าผิดปกติโดยที่ไปป้อนเข้ามาเป็นพัก ๆ ที่เรียกว่า burst ก็ได้

วิจารณ์

การตรวจคุณสมบัติไฟฟ้าสมองในผู้ป่วยด้วยโรคเนื้องอกภายในซ่องกระเพาะศีรษะ อาจ

๒. ความผิดปกติในไฟฟ้าคลื่น

ไฟฟ้าที่ผิดปกติอาจปรากฏจากตำแหน่งของเนื้องอกหรือข้อบขอในเนื้องอกหรือบริเวณใกล้ๆ จากเนื้องอกก็ได้ ความผิดปกติในไฟฟ้าที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงของลักษณะคลื่นไฟฟ้าตามอัตราเดิม เช่น

๒.๑.๑ การเพิ่มหรือลด amplitude ของคลื่น alpha อาจเกิดขึ้นเมื่อไฟฟ้าที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะผิดปกติ เช่น บริเวณที่มีคลื่น alpha ต่ำกว่าท่อน ๑ เท่าตัน

๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นไฟฟ้าต่อการกระตุ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงของคลื่น alpha ต่อการดูดตาและหลับตา และต่อการกระตุ้นด้วยแสง รวมถึงการที่คลื่น alpha ไม่ลดลงที่บริเวณ occipital ข้างหน้าเมื่อมดตามชังพบริสุทธิ์เป็นโรคใน optic radiation ข้างนั้น

๒.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงของ frequency ของคลื่นสมอง เช่นการปรากฏของคลื่น theta

๒.๒ คลื่นไฟฟ้าผิดปกติ ได้แก่ การปรากฏของ slow หรือ delta activity ในขนาดค่อนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ รอบ ต่อวินาที

ซึ่งพบร่วม กับการ ทำลายต่อสมอง และ การปรากฏของคลื่น sharp wave หรือ spike ซึ่งพบเมื่อมีการกระตุ้นต่อเซลล์สมอง

คลื่นไฟฟ้าผิดปกตินี้ช่วยในการ บอกตำแหน่งของพยาธิสภาพได้ เรียกว่าเป็น focus ของการผิดปกติ ทั้งโดยอาศัยผลก णฑ์ที่หลายอย่าง ได้แก่

๒.๒.๑ คลื่นไฟฟ้าผิดปกติในบางกรณี คลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะหายไปในบางกรณี คลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะหายไปเมื่อทำการกระตุ้น ทั้งโดยสามารถบอกตำแหน่งผิดปกติได้

หรือในบางรายที่มีคลื่นไฟฟ้าผิดปกติเป็นบริเวณกว้าง แต่มีจุดซึ่งมีลักษณะผิดปกติมากที่สุด ก็จะหายไปเมื่อบอกตำแหน่งผิดปกติ

๒.๒.๒ Phase reversal การที่คลื่นไฟฟ้ามีลักษณะข้ามหลักกันอยู่ในบริเวณที่ต่างกัน ก็จะช่วยบอกตำแหน่งของต้นกำเนิดของคลื่นที่ผิดปกตินั้น

๒.๒.๓ ความแตกต่างของเวลา คลื่นที่ผิดปกติหากปรากฏในเวลาต่อเนื่องกันจากการกระชาบจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง การเบร์บเทียบที่คลื่นไฟฟ้าช่วยบอกตำแหน่งที่เกิด คลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินั้น ก่อนซึ่งย้อมหมายถึงจุดที่มีพยาธิสภาพอยู่

ดังนั้นในการตรวจคัดกรองไฟฟ้าสมองนั้น จะพบลักษณะผิดปกติได้หลายอย่าง ซึ่งจะต้องวิเคราะห์โดยละเอียด และโดยอาศัยความชำนาญของผู้อ่านผล จะจะได้ผลเต็มที่ ลักษณะผิดปกติ ที่พบในการตรวจคัดกรองไฟฟ้าสมองคงที่กันตามนี้ นอกจากพบในโรคเนื่องอกในสมองแล้ว ยังอาจพบในโรคอื่น ๆ ได้อีก การผิดปกติโดยทั่วไปทั่งศีรษะอาจพบในผู้ป่วยที่มีความดันเพิ่มน้ำหนักในช่องกระดูกศีรษะ หรือผู้ป่วยที่ซึมไม่ค่อยรู้สึกตัว จะด้วยเหตุใดก็ได้การผิดปกติเฉพาะแห่ง อาจพบได้ในโรคพิรูเงินของในสมอง เมื่อสมองขยายจากหมัดเลือดดูดตัน ก้อนเลือดในเนื้อสมองหรือเนื้อสมองเสื่อมฯ ให้ ดังนั้นการตรวจคัดกรองไฟฟ้าสมอง จึงบอกได้แต่ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ ในบางกรณีอาจบอกได้ว่าเกิดขึ้นที่ใด แต่ไม่สามารถบอกชนิดของพยาธิสภาพนัด (^{7,10}) ในกรณีใช้การตรวจคัดกรองไฟฟ้าสมองเป็น screening test สำหรับบอกว่ามีการผิดปกติเกิดขึ้นภายในสมองหรือไม่นั้น ในการศึกษาของเรานับว่าวัยไตรอุบัติ ๔๙ ของผู้ป่วยทุกคนเนื่องจากภายในช่องกระดูกศีรษะ ซึ่งใกล้เคียงกับวัยงานของ Fischgold⁽⁵⁾ ซึ่งทำการศึกษาผู้ป่วยด้วยใน ส่วน ๔๐๗ รายพบว่าผิดปกติร้อยละ ๙๒

ตำแหน่งของเนื้องอก มีความสำคัญใน การให้ผลผิดปกติในการตรวจคัดกรองไฟฟ้าสมองจากการศึกษาของ Fischgold⁽⁵⁾ ระบุว่า ออกบริเวณ cerebral hemisphere ให้ผลผิดปกติร้อยละ ๙๔ ส่วนเนื้องอกที่บริเวณ posterior cranial fossa มีผลผิดปกติร้อยละ ๘๐ สำหรับเนื้องอกที่ต่อม pituitary การตรวจคัดกรองไฟฟ้าสมองให้ผลผิดปกติน้อยและใช้ในการ screen ไม่ได้

หากพิจารณาความสามารถในการบอกร่องรอยของเนื้องอกแล้ว ร่วมครึ่งหนึ่งของเนื้องอกภายในช่องกระดูกศีรษะ บอกตำแหน่งให้ถูกต้องด้วยการตรวจคัดกรองไฟฟ้าสมองเนื้องอกในตำแหน่งต่าง ๆ กันก็ให้ผลต่างกัน ในรายงานของ Fischgold⁽⁵⁾ ระบุว่าใน cerebral hemisphere ๔๗๔ ราย บอกตำแหน่งได้ถูกต้องนั้น ๔๐๖ ราย หรือร้อยละ ๘๐ แต่นอกจากนี้ ส่วน ก่อจาง และ ฐาน ของสมองและในส่วน posterior cranial fossa บอกตำแหน่งไม่ได้ ได้แก่ พยาบาลศึกษาหาลักษณะพิเศษ ที่พบในการตรวจคัดกรองไฟฟ้าสมอง ในผู้ป่วยด้วยโรคเนื้องอกในส่วนกลาง และ posterior fossa แต่บอกร่องรอยไม่พบลักษณะที่แน่นอนและได้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคจริง ๆ (^{3,9})

การตรวจคลนไฟฟ้าสมอง

207

ในการตรวจคลนไฟฟ้าสมอง ในผู้ป่วยด้วยโรคเนื้องอกในช่องกะโหลกศีรษะนี้ มีเหตุผล หลายอย่างที่ลูกความแม่นยำในการบอกความผิดปกติ และในการบอกตำแหน่งของเนื้องอกได้แก่

๑. ด้านเทคนิค เทคนิคในการทำตลอดจนความละเอียดในการการ electrode และระยะเวลาที่ทำ ย่อมมีผลให้ความแม่นยำเปลี่ยนแปลงไป หากใช้ electrode เพียงอัน ว่าในระยะห่างกันมีความแม่นยำสูงใช้ electrode มาก อันหรือกว่าอย่างใน international standard ไม่ได้ ความจำเป็นที่จะต้องทำในผู้ป่วยจำนวนมาก โดยมีเครื่องมือและเจ้าหน้าที่อย่างไรสามารถทำให้ละเอียดอย่างที่ต้องการได้

๒. ด้านการแปลผล ย่อมบันอยู่กับแพทย์ซึ่งทำหน้าที่แปลผล หากมีความชำนาญมาก ก็ยอมได้ผลดี การใช้ลักษณะผิดปกติเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ชัดเจนประกอบในการแปลผล ย่อมช่วยให้การแปลผลทำได้แม่นยำขึ้น

๓. ด้านพยาธิสภาพในสมอง ความผิดปกติในคลนไฟฟ้าสมอง มีได้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ หลายอย่าง ลักษณะผิดปกติที่ปรากฏจึงมีได้หลายแบบ การแปลผลจึงอาจผิดไปได้ ความผิดปกติโดยทั่วไปจากการ

เพิ่มความดันภายในช่องกะโหลกศีรษะ อาจบดบังความผิดปกติเฉพาะที่ ทำให้บอกตำแหน่งของเนื้องอกไม่ได้ หรือพยาธิสภาพแห่งนั้นอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติของสมองส่วนที่ใกล้ออกไปเมื่อผลให้เกิดคลนไฟฟ้าสมองผิดปกติอยู่ผิดที่ได้

การตรวจคลนไฟฟ้าสมอง เป็นวิธีที่ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วย และไม่มีอันตราย ประกอบกับราคาก็ใช้จ่ายค่อนข้างถูก เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจพิเศษด้านระบบประสาทด้วยวิธีอื่น ๆ วันจะได้ประโยชน์ในการตรวจหาเนื้องอกในช่องกะโหลกศีรษะ

สรุป

๑. ผู้ป่วยด้วยเนื้องอกภายในช่องกะโหลกศีรษะ ๖๔ ราย ให้ผลการตรวจคลนไฟฟ้าสมองผิดปกติ ร้อยละ ๘๗

๒. เนื้องอกในช่อง supratentorial ให้ผลผิดปกติร้อยละ ๙๑

๓. ในการตรวจคลนไฟฟ้าสมองพบผิดปกติ ๕๗ รายนั้นเป็นลักษณะผิดปกติทั่วไป ๔๙ ทั้งศีรษะร้อยละ ๓๗ ลักษณะผิดปกติเฉพาะที่ ถูกต้องตามตำแหน่งของเนื้องอกร้อยละ ๕๗ และลักษณะผิดปกติ ผิดร้อยละ ๑๐

๔. เนื้องอกในท่อ supratentorial ๔๙ ราย ให้ผลปกติ ๔ ราย, ผลผิดปกติ และบอกร้าวหนักเจ็บปวดต้อง ๓๐ ราย, ผลผิดปกติท่วงไปทั่วศรีษะ ๙ ราย และบอกร้าวหนักทั่ว ๕ ราย
๕. เนื้องอกของต่อม pituitary การตรวจคัดล่อไฟฟ้าสมองให้ผลปกติ.

Reference

1. Arfel, G. & Fischgold, H. EEG-signs in tumors of the brain. *Electroenceph. clin. Neuro Physiol. Suppl.* 19: 36 - 50, 1961.
2. Cobb, W.A. The electroencephalographic localization of intracranial neoplasms. *J. Neurol. Neurosurg Psychiat.* 7: 96 - 102, 1944.
3. Cobb, W.A. & Gassel, M.M. the EEG. with lateral ventricle meningiomas. *Electroenceph. clin. Neurophysiol. Suppl.* 19: 111 - 124, 1961.
4. Daly, D.D. The effect of sleep upon the electroencephalogram in patients with brain tumors. *Electroenceph. clin. Neurophysiol.* 25: 521 - 529, 1968.
5. Fischgold, H., Zalis, A. & Buisson-Ferey, J. General comments on the use of the EEG in the diagnosis and localization for cerebral tumours. *Electroenceph. clin. Neurophysiol. Suppl.* 19: 51 - 74, 1961.
6. Hess, R. Significance of EEG signs for location of cerebral tumours. *Electroenceph. clin. Neurophysiol. Suppl.* 19: 75 - 110, 1961.
7. Joynt, R.J., Cape, C.A. & Knott, J.R. the significance of focal delta activity in adult electroencephalogram. *Arch. Neurol.* 12: 631, 1965.
8. Kershmann, J., Conde, A. & Gibson, W.C. Electroencephalography in differential diagnosis of supratentorial tumors. *Arch. Neurol. Psychiat.* 62: 255 - 268, 1949.
9. Martinius, J., Matthes, A. & Lombroso, C.T. Electroencephalographic features in posterior fossa tumors in children. *Electroenceph. clin. Neurophysiol.* 25: 128 - 139, 1968.
10. Van der Drift, J.H.A. & Magnus, O. The value of the EEG in the differential diagnosis of cases with cerebral lesions. *Electroenceph. clin. Neurophysiol. Suppl.* 19: 183 - 1961.