

หวัตรรรมตาจากเชื้อไวรัสแล้ว ก็ควรจะนึกถึงสาเหตุอื่น ๆ ดังที่ได้กล่าวไว้โดยสังเขป ถ้าผู้ป่วยมีอาการไม่ทุเลาควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางโรคแพ้

พูนศรี เลชะกุล

แผนกกุมารเวชศาสตร์ ร.พ. จุฬาลงกรณ์

ถาม

ในกรณีที่ขณะกินยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วไม่ทราบที่ตั้งครรภ์ขึ้นมา ยังคงกินต่อไปจะมีผลเสียต่อทารกในครรภ์อย่างไรบ้าง

ตอบ

ปัญหาดังกล่าวมักจะมีเกิดกับสตรีที่กินยาเม็ดคุมกำเนิดเอง โดยซื้อตามร้าน และไม่เคยได้รับการอธิบายถึงวิธีใช้ที่ถูกต้อง เพราะ

เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ทั้ง ๆ ที่ยังกินยาเม็ดคุมกำเนิด อันตรายต่อทารกในครรภ์ยังไม่ปรากฏในรายงานการแพทย์ เพราะยาเม็ดคุมกำเนิดที่ขายในท้องตลาดปัจจุบันเป็นสารสังเคราะห์ของฮอร์โมน estrogen กับ progestin compound ซึ่งคุณสมบัติทางชีวเคมีคล้ายกับ Estrogen และ Progesterone ซึ่งสร้างจากธรรมชาติโดยรังไข่และรก

สำหรับยาคุมกำเนิดบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางด้าน androgenic effect ควรใช้ด้วยความระวัง เพราะถ้าเด็กในครรภ์เป็นเพศหญิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ในบางครั้งพบว่าภายหลังกินยาคุมกำเนิดแล้วระดูยังไม่มา สตรีผู้นั้นก็เริ่มกินยาสำหรับรอบเดือนต่อไปโดยเฉพะยาที่มี 28 เม็ด เพราะได้รับคำแนะนำว่าให้กินยาติดต่อกันเรื่อยไป ผู้เขียนมีความเห็นว่า ถ้าสตรีที่กินยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วไม่มีระดูติดต่อกัน 2 ครั้ง ควรให้แพทย์ตรวจให้แน่ใจว่าไม่ตั้งครรภ์ เคยมีรายงานที่การรักษาคนตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ด้วย progesterone แล้ว มีอัตราการเกิด ปากแห้ง เพดานโหว่¹ สูงกว่าคนที่ไม่ได้รับยา การใช้ยาที่มีผลคล้าย estrogen นาน ๆ ระหว่างตั้งครรภ์ เช่น ให้ diethyl stilbestrol ในการป้องกันการแพ้ในระยะแรกๆ² ก็มีรายงานว่า มี Carcinoma ของ vagina เกิดร่วมในเด็กหญิงนั้นเมื่อเข้าวัย puberty ข้อสังเกตนี้ก็ได้สรุปว่าภาวะผิดปกติดังกล่าวมีสาเหตุมาจากยาที่มี estrogen.

เอกสารอ้างอิง

1. Eichner E. Clinical use of 17-hydroxyprogesterone caproate in the prevention of premature labor and its effect upon fetal salvage, *Ann. N.Y. Acad Sci* 71:789, 1971
2. Herbst AL, Ulfender H, Pashanzer D. Adenocarcinoma of the vagina: Association of maternal. Stilbestrol therapy with appearance in young women, *New Eng. J. Med* 284:878, 1971

สุภวัฒน์ ชุตินวงศ์

แผนกสูติ-นรีเวชศาสตร์ ร.พ. จุฬาลงกรณ์