

Garamycin Kanamycin หรือ Colimycin ในรายที่มีอาการรุนแรงและสงสัย septicemia ควรจะรับไว้รักษาในโรงพยาบาลและให้ยาประเภทนี้

ในการรักษาระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบในเด็กหรือผู้ชายควรตรวจพิเศษทุกราย เพราะว่ามีผู้ใหญ่หรือผู้ชายที่มีระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบมักจะมีความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะอยู่ด้วยเสมอ อย่างน้อยควรทำ intravenous pyelogram (I.V.P.) ผู้หญิงมีโอกาสเป็นระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบได้ง่าย จึงมักจะตรวจพิเศษเมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 การตรวจพิเศษหมายความถึง I.V.P. Voiding cystourethrogram หรือ Retrograde pyelography การตรวจเหล่านี้ควรจะทำเมื่อจำเป็นเท่านั้น

พวก Nalidixic acid Furadantin หรือ Mandelamine เป็นยาฆ่าเชื้อในปัสสาวะ (Urinary antiseptic) ไม่นิยมใช้เป็นยารักษาโดยตรงควรใช้เมื่อต้องการรักษาเป็นระยะยาว

ชาญ โพนนกุล

หน่วยไต แผนกอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ถาม

เด็กที่คลอดโดยทำ forceps extraction แล้ว

ปรากฏว่าแขนขาทั้งแขนไม่มีการเคลื่อนไหวเลย ควรจะให้การรักษาอย่างไร

ตอบ

อัมพาตของแขนที่เกิดจากการคลอด (obstetric paralysis) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด

1. อัมพาตแขนส่วนบน (Erb-Duchenne paralysis)
2. อัมพาตแขนส่วนล่าง (Klumpke paralysis)
3. อัมพาตทั้งแขน

ชนิดแรกการพยากรณ์โรคดีที่สุด รองลงมา ก็เป็นชนิดที่สอง ส่วนชนิดที่สามเลวที่สุด อย่างไรก็ตาม กว่าจะหายขาดต้องใช้เวลาเป็นเดือน

ความพิการที่เกิดขึ้นแล้วแต่ชนิดของอัมพาต เช่น ชนิดแรกกล้ามเนื้อที่เป็นอัมพาตมี Deltoid, External rotators ของหัวไหล่ Biceps brachialis Supinator และ Brachioradialis ฉะนั้นความพิการที่เกิดขึ้นคือที่หัวไหล่มี adduction และ internal rotation แขนส่วนล่างอยู่ในท่า pronation ถ้าคนไข้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ข้อต่างๆ ก็จะติดในท่านั้นๆ (contracture)

ความมุ่งหมายของการรักษามีดังนี้

1. ป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้น
2. แก้ความพิการที่เกิดขึ้นแล้ว